Activités : Groupes caractéristiques et spectroscopie infrarouge (IR)

I. La spectroscopie IR

Document 1 : Intérêt de la spectroscopie IR

La spectroscopie IR est une technique spectroscopique qui permet d'analyser des solides, des liquides ou des gaz.

Dans l'industrie, elle trouve des applications pour les contrôles de qualité dans l'agroalimentaire ou pour la recherche de polluants dans l'atmosphère. Au laboratoire, elle est utilisée pour l'identification des espèces chimiques synthétisées.

Même si, comme d'autres analyses physico-chimiques dites destructives, elle nécessite des prélèvements de matière, cette technique présente un grand avantage, car la quantité d'échantillon qui doit être prélevée est extrêmement faible. Les micro-prélèvements se pratiquent à l'aide d'une aiguille.

Document 2 : Origine du spectre IR

Les molécules peuvent être assimilées à un ensemble de masses (les atomes) reliées par des ressorts différents (les liaisons simples, doubles...).

Les atomes d'une molécule ne sont pas fixes, ils peuvent vibrer! A chaque type de liaison correspond une fréquence de vibration qui lui est propre et qui dépend des atomes liés par la liaison.

En présence de rayonnement IR, les liaisons chimiques se mettent à vibrer lorsqu'elles sont soumises à des rayonnements de fréquence égale à leur fréquence propre. Le rayonnement étant absorbé par la liaison pour pouvoir vibrer, il en résulte une bande ou un pic (si la bande est très fine) d'absorption.

La spectroscopie IR permet donc de déterminer les groupes fonctionnels d'une molécule.

Document : Un exemple de spectre IR

Le spectre ci-dessus est le spectre IR du pentane. En ordonnée figure la transmittance T ou intensité lumineuse transmise par l'échantillon. Elle est exprimée en pourcentage.

En abscisse est porté le nombre d'onde σ , inverse de la longueur d'onde λ ($\sigma = 1 / \lambda$), exprimée généralement en cm^{-1} . Les radiations infrarouges exploitées en chimie organique s'étendent de 600 cm^{-1} à 4000 cm^{-1} .

Les bandes d'absorption associées à chacune des liaisons rencontrées correspondent à un domaine de nombre d'ondes bien précis. (voir rabat couverture du livre)

Ainsi dans le spectre du pentane, on reconnaît les bandes d'absorption relatives aux liaisons C-H. En revanche celles relatives aux liaisons C-C ($\sigma < 1400 \text{ cm}^{-1}$) est inexploitable.

Questions

1. Quels sont les intérêts de la spectroscopie IR ?
2. Pourquoi certaines radiations IR sont-elles absorbées par les molécules et pas d'autres ?
3. Que signifie une transmittance de 100% ? Une transmittance de 0% ? Justifier alors pourquoi les bandes d'absorption d'un spectre IR pointent vers les bas ?
4. Quelles sont les valeurs limites des longueurs d'onde (exprimées en nm et μm) des radiations utilisées en IR ?
5. Pourquoi n'exploite-t-on généralement pas le domaine $\sigma < 1400 \text{ cm}^{-1}$?

II. Exploitation de spectres IR

On donne ci-dessous les spectres IR de plusieurs molécules.

1. Pour chaque molécule, écrire la formule semi-développée, entourer et nommer les groupes caractéristiques.
2. Retrouver dans le spectre de chaque composé les bandes d'absorption relatives aux principales liaisons présentes.

III- Identification d'un composé

Le document 11 fournit de spectre de l'un des trois composés suivants. Lequel ?

IV- Les limites de la spectroscopie infrarouge

Ecrire la formule semi-développée du pentan-2-one et du pentan-3-one.

On donne ci-dessous le spectre IR de chaque molécule.

Spectre du pentan-2-one

Spectre du pentan-3-one

Les spectres IR permettent-ils de distinguer les deux molécules ? Justifier

► Bandes caractéristiques en spectroscopie IR

Famille	Liaison	Nombre d'onde (cm ⁻¹)
alcane	C-H (élongation) C-H (déformation)	2850-3000 1370-1470
alcène	C=C C-H	1650 3000-3080
cétone	C=O	1705-1725
aldéhyde	C-H C=O	2650-2830 1720-1740
acide carboxylique	O-H C=O C-O	3450-3550 1740-1800 1080-1190
ester	C=O C-O	1730-1750 1050-1300
alcool	O-H lié O-H libre	3200-3450 3600-3700
amine	C-N N-H	1030-1230 1640-1560
amide	N-H C=O C≡N	3300-3500 1620-1700 2200-2260

► Déplacements chimiques en spectroscopie RMN

Environnement du proton	δ (ppm)
0,8 à 2
3 à 4,1
2,5 à 4
R-OH (alcool)	1 à 6
R-CHO (aldéhyde)	9,5 à 9,9
2 à 2,7
H-COO-R (ester)	8 à 8,5
R-CO ₂ H (acide carboxylique)	10 à 13

► Bandes caractéristiques en spectroscopie IR

Famille	Liaison	Nombre d'onde (cm ⁻¹)
alcane	C-H (élongation) C-H (déformation)	2850-3000 1370-1470
alcène	C=C C-H	1650 3000-3080
cétone	C=O	1705-1725
aldéhyde	C-H C=O	2650-2830 1720-1740
acide carboxylique	O-H C=O C-O	3450-3550 1740-1800 1080-1190
ester	C=O C-O	1730-1750 1050-1300
alcool	O-H lié O-H libre	3200-3450 3600-3700
amine	C-N N-H	1030-1230 1640-1560
amide	N-H C=O C≡N	3300-3500 1620-1700 2200-2260

► Déplacements chimiques en spectroscopie RMN

Environnement du proton	δ (ppm)
0,8 à 2
3 à 4,1
2,5 à 4
R-OH (alcool)	1 à 6
R-CHO (aldéhyde)	9,5 à 9,9
2 à 2,7
H-COO-R (ester)	8 à 8,5
R-CO ₂ H (acide carboxylique)	10 à 13